

**マイスタン錠 5mg**  
**マイスタン錠 10mg**  
**マイスタン細粒 1%**

**【この薬は？】**

販売名	マイスタン錠 5mg MYSTAN Tablets 5mg	マイスタン錠 10mg MYSTAN Tablets 10mg	マイスタン細粒 1% MYSTAN Fine Granules 1%
一般名	クロバザム Clobazam		
含有量	5mg (1錠中)	10mg (1錠中)	10mg (細粒 1g 中)

**患者向医薬品ガイドについて**

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」  
<http://www.info.pmda.go.jp/> に添付文書情報が掲載されています。

**【この薬の効果は？】**

- ・この薬は、抗てんかん剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳内の神経の過剰な興奮をはずめて、てんかん発作を抑えます。
- ・次の目的で処方されます。

**他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかんの下記発作型における抗てんかん薬との併用**

**部分発作**

**単純部分発作、複雑部分発作、二次性全般化強直間代発作**

**全般発作**

**強直間代発作、強直発作、非定型欠神発作、ミオクロニー発作、脱力発作**

- ・この薬は他の抗てんかん薬と併用されます。
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・過去にマイスタンに含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
  - ・急性狭隅角緑内障の人
  - ・重症筋無力症の人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。
  - ・心臓に障害のある人
  - ・肝臓に障害のある人、腎臓に障害のある人
  - ・脳に器質的な障害がある人
  - ・高齢の人
  - ・衰弱している人
  - ・呼吸機能が低下している人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。通常、飲む量と回数は次のとおりです。

[成人の場合]

マイスタン錠 5mg、マイスタン錠 10mg の場合

	開始量	維持量	最高量
1日量	クロバザムとして 10mg	クロバザムとして 10～30mg	クロバザムとして 40mg
飲む回数	1日1～3回に分けて飲みます。		

マイスタン錠 5mg、マイスタン 10mg を組み合わせて飲むことがあります。

マイスタン細粒 1% の場合

	開始量	維持量	最高量
1日量	1g (クロバザムとして 10mg)	1～3g (クロバザムとして 10～30mg)	4g (クロバザムとして 40mg)
飲む回数	1日1～3回に分けて飲みます。		

[小児の場合]

マイスタン錠 5mg、マイスタン錠 10mg の場合

	開始量	維持量	最高量
1 日量	体重 1kg あたり クロバザムとして 0.2mg	体重 1kg あたり クロバザムとして 0.2~0.8mg	体重 1kg あたり クロバザムとして 1.0mg
飲む回数	1 日 1 ~3 回に分けて飲みます。		

マイスタン錠 5mg、マイスタン 10mg を組み合わせて飲むことがあります。

マイスタン細粒 1% の場合

	開始量	維持量	最高量
1 日量	体重 1kg あたり 0.02g (クロバザムとして 0.2mg)	体重 1kg あたり 0.02~0.08g (クロバザムとして 0.2~0.8mg)	体重 1kg あたり 0.1g (クロバザムとして 1.0mg)
飲む回数	1 日 1 ~3 回に分けて飲みます。		

### ●どのように飲むか？

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回分とばして、次の時間に 1 回分飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

嗜眠（目が覚めない）、錯乱、失調（手足の運動がうまくゆかない）、呼吸抑制、血圧低下、昏睡（意識がなくなる）などの症状があらわれることがあります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、使用を中止し、ただちに受診してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・飲み始めの時期に眠気、ふらつきなどの症状があらわれることがありますこのような症状があらわれたら医師に相談してください。
- ・この薬は飲むのを中止したり、急に量を減らした場合に、てんかん発作をくりかえし、なかなか回復しない状態（てんかん重積状態）があらわれることがあります。飲む量を減らす場合には時間をかけて少しずつ減らしていきます。自分の判断で飲むのを止めたり急に減らしたりせずに、医師の指示通りに飲んでください。
- ・この薬の使用中は、定期的に肝機能検査、腎機能検査、血液検査が行われることがあります。
- ・眠気がおこったり、注意力・集中力・反射運動の能力などが低下することがありますので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。

- ・特に小児や高齢の人で、喘鳴（息をするときヒューヒューと音がする、息苦しい）、喀痰増加、気道分泌過多（痰が増える）、唾液分泌過多（口の中に唾液があふれる）、嚥下障害（飲み込みにくい）があらわれ、肺炎、気管支炎にいたることがあります。このような症状があらわれた場合は、使用を中止し、ただちに受診してください。
- ・アルコール飲料はこの薬の効果に影響しますので、控えてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？









特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
依存性 いぞんせい	薬がないといられない、薬を中止すると手足がふるえて不眠・不安・けいれん・幻覚などをおこす
呼吸抑制 こきゅうよくせい	息苦しい、息切れ
中毒性表皮壊死融解症（TEN） ちゅうどくせいひょうひえし ゆうかいしょう（テン）	からだがだるい、関節の痛み、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ（水疱）、発熱、食欲不振
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンスジョンソン症候群） ひふねんまくがんしょうこうぐん	からだがだるい、高熱、発熱、まぶたや眼の充血、結膜のただれ、ひどい口内炎、唇や口内のただれ、食欲不振、赤い発疹（ほっしん）、中央にむくみをともなった赤い斑点、陰部の痛み

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	からだがだるい、関節の痛み、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ（水疱）、発熱、高熱
眼	まぶたや眼の充血、結膜のただれ
口や喉	ひどい口内炎、唇や口内のただれ
腹部	食欲不振
胸部	息苦しい、息切れ
手・足	関節の痛み
皮膚	全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ（水疱）、赤い発疹（ほっしん）、中央にむくみをともなった赤い斑点
その他	薬がないといられない、薬を中止すると手足がふるえて不眠・不安・けいれん・幻覚などをおこす、陰部の痛み

## 【この薬の形は？】

販売名	マイスタン錠 5mg	マイスタン錠 10mg
PTP シート		
形状	割線入りの錠剤   	割線入りの錠剤   
直径	6.5mm	7.0mm
厚さ	2.3mm	2.5mm
重さ	0.10g	0.12g
色	うすいだいだい色	白色
識別コード	P771	P772

販売名	マイスタン細粒 1%
形状	
色	白色

## 【この薬に含まれているのは？】

販売名	マイスタン錠 5mg	マイスタン錠 10mg	マイスタン細粒 1%
有効成分	クロバザム		
添加物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、タルク、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、黄色五号	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、タルク、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム	乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、プルラン、ステアリン酸カルシウム、タルク

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：大日本住友製薬株式会社

(<http://www.ds-pharma.co.jp/>)

くすり情報センター

電話番号：0120-885-736

受付時間：9時～18時30分

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）