

セレネース内服液 0.2%

【この薬は？】

販売名	セレネース内服液 0.2% Serenace Internal Liquid 0.2%
一般名	ハロペリドール Haloperidol
含有量 (1mL 中)	2mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、精神神経用剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳内の神経伝達物質の受容体に作用してそのバランスを整えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

統合失調症

そう病

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・昏睡状態の人
- ・バルビツール酸誘導体などの中枢神経抑制剤の強い影響下にある人
- ・重い心不全の人
- ・パーキンソン病の人
- ・過去にセレネースに含まれる成分またはブチロフェノン系化合物で過敏症のあった人
- ・アドレナリン（ボスミン）を使用している人（アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く）
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・肝臓に障害のある人
- ・心臓や血管の病気の人、低血圧の人、またはこれらが疑われている人
- ・QT 延長を起こしやすい人（QT 延長を起こすことが知られている薬剤を使用している人、低カリウム血症のある人など）
- ・てんかんなどのけいれんをおこす病気のある人、または過去におこしたことがある人
- ・甲状腺機能亢進状態の人
- ・高齢の人
- ・小児
- ・過去に薬剤で過敏症のあった人
- ・脱水の人や栄養状態の悪い人、脳に器質的障害のある人
- ・高温環境下にある人

○この薬には併用してはいけない薬[アドレナリン（アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く）（ボスミン）]や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。通常、成人の飲む量は、次のとおりです。

販売名		セレネース内服液 0.2%
一日量	開始量	0.75～2.25mg (0.375～1.125mL)
	維持量	3～6mg (1.5～3mL)

●どのように飲むか？

決められた1回量を、計量カップ、スポイトなどではかり、飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

低血圧（ふらつき、立ちくらみ）、過度の鎮静（静かになる）、重症の錐体外路症状（筋強剛（手の曲げ伸ばしがぎこちない、筋肉のこわばり）、振戦（手足のふるえ）、ジストニア症状（からだか意志に反して動く、手足が意志に反して動く））があらわれることがあります。また、呼吸抑制（息苦しい、息切れ）および低血圧をとまなう昏睡状態（意識がなくなる）や心電図異常があらわれることがあります。

いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・眠気、注意力・集中力・反射能力などの低下がおこることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ・抗精神病薬を飲んでいる人には、肺塞栓症（突然の息切れ）、静脈血栓症（下肢のむくみ・痛み）などが報告されています。長時間動かないでじっとしている人、長期間病床にある人、肥満の人、脱水状態の人は特にこれらの症状に注意して下さい。
- ・授乳を中止してください。
- ・アルコール飲料はこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
悪性症候群 (Syndrome malin) あくせいしょうこうぐん (シンドローム マリン)	38℃以上の発熱、ふるえ、意識がうすれる、考えがまとまらない、判断力が低下する、飲み込みにくい、筋肉のこわばり
心室細動 しんしつさいどう	めまい、眼の前が暗くなる、胸の痛み、胸の不快感、動悸
心室頻拍 しんしつひんぱく	息切れ、動悸、脈が速くなる
麻痺性イレウス まひせいイレウス	吐き気、嘔吐（おうと）、激しい腹痛、食欲不振、腹がはる、便がでない
遅発性ジスキネジア ちはつせいジスキネジア	意志に反して体が動く、意志に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず嚙むような口

	の動き
抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (S I A D H) こうりにょうホルモンふてきごうぶんびつしょうこうぐん (エスアイエーディーエイチ)	けいれん、意識の低下、頭痛、吐き気、嘔吐、食欲不振
無顆粒球症 むかりゆうきゅうしょう	発熱、のどの痛み
白血球減少 はつけっきゅうげんしょう	発熱、のどの痛み
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、皮下出血、出血が止まりにくい
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	脱力感、手のしびれ、手足のこわばり、足のしびれ、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる
肺塞栓症 はいそくせんしょう	突然の息切れ、胸の痛み、血を吐く
深部静脈血栓症 しんぶじょうみゃくけっせんしょう	手足の爪が青紫色～暗紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛みとはれ
肝機能障害 かんきのうしょうがい	からだがだるい、白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐、食欲不振、かゆみ、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿が褐色になる

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	38℃以上の発熱、からだがだるい、けいれん、ふるえ、脱力感、発熱、意志に反して体が動く
頭部	意識がうすれる、めまい、意識の低下、考えがまとまらない、頭痛、判断力が低下する
顔面	鼻血
眼	眼の前が暗くなる、白目が黄色くなる
口や喉	飲み込みにくい、意志に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず嚙むような口の動き、吐き気、嘔吐、のどの痛み、歯ぐきの出血、血を吐く
胸部	息切れ、吐き気、胸の痛み、胸の不快感、動悸、突然の息切れ
腹部	激しい腹痛、食欲不振、吐き気、腹がはる
手・足	手のしびれ、手足のこわばり、足のしびれ、手足の爪が青紫色～暗紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛みとはれ、脈が速くなる
皮膚	皮膚が黄色くなる、かゆみ、あおあざができる、皮下出血
筋肉	筋肉のこわばり、筋肉の痛み
便	便がでない
尿	尿が褐色になる、尿が赤褐色になる、尿の色が濃くなる
その他	出血が止まりにくい

【この薬の形は？】

販売名	セレネース内服液 0.2%
形状	無色ほとんど澄明の液

【この薬に含まれているのは？】

販売名	セレネース内服液 0.2%
有効成分	ハロペリドール
添加物	パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、乳酸

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：大日本住友製薬株式会社 (<https://www.ds-pharma.co.jp/>)

くすり情報センター

電話：0120-885-736

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）